

Monatsversammlung Juni 2026

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Monatsversammlung

Juni 2026



Rotschopfige Sandbiene auf einem Wald-Geißbart

Uwe Wacker

Monatsversammlung Juni 2026

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Themen für Juni 2026

- Waldtracht
- Pflege von Jungvölkern
- Honig Schleudern

Monatsversammlung Juni 2026

Waldtracht

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



- Mit etwas Glück und günstigem Wetter kann es im Juni/ Juli Waldtracht von Fichten, Tannen ev auch von anderen Bäumen geben.
- Bei Fichten dominieren zwei Honigtauerzeuger:
 - Fichtenquirlschildläuse (Große oder Kleine Lecanie) und
 - Rotbraune Bepuderte Fichtenrindenlaus (Cinara pilicornis)
- Bei Tannen dominiert die Grüne Tannenrindenlaus (Cinara pectinatae)
- Für eine ergiebige Waldtracht ist jeweils ein Massenbefall notwendig, der relativ selten vorkommt.
- **Dieses Jahr gibt es bisher nur wenige Honigläuse**

Monatsversammlung Juni 2026

Waldtracht

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Fichtenquirleschildlaus
Kleine Lecanie



© Uwe Wacker 11. Juni 2026

Monatsversammlung Juni 2026

Waldtracht

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Rotbraun Bepuderte
Fichtenrindenlaus



Monatsversammlung Juni 2026

Waldtracht

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Rotbraun Bepuderte
Fichtenrindenlaus



© Uwe Wacker 11. Juni 2026

Monatsversammlung Juni 2026

Waldtracht

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Grüne
Tannen
Rindenlaus




© Uwe Wacker 11. Juni 2026

Monatsversammlung Juni 2026

Waldtracht

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Rindenläuse werden
von vielen „Räubern“
vernichtet
u. a. von den Larven
der Marienkäfer
Eine Larve frisst ca.
100 Läuse am Tag



Monatsversammlung Juni 2026

Waldtracht

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Manchmal gibt es auch noch
Honigtau von der Schwarzen
Fichten Rindenlaus
(*Cinara piceae*).

Dieser Honig kandiert in den
Waben (Zementhonig) und
lässt sich kaum noch
schleudern.

2023-2024 gab es sehr viel
Zementhonig.

Bild: Wikipedia



Monatsversammlung Juni 2026

Pflege von Jungvölkern

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



- Die Ende Mai gebildeten Jungvölker werden ca 4 Wochen später eine begattete Königin haben, die dann anfängt zu legen.
- Die Königin sollte dann gezeichnet werden.
- In der Zeit danach, sieht man, ob die Bienen ein schönes geschlossenes Brutnest anlegen.
- Wenn das Brutnest zu viele „Löcher“ hat, Königin verwerfen.

Monatsversammlung Juni 2026

Pflege von Jungvölkern

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



- Nach Ende von Massentrachten müssen Jungvölker regelmäßig gefüttert werden, bis im Volk ca 2,5-3kg Futter (1-2 Futterwaben) verfügbar sind.
Dazu 0,5l-1l Flüssigfutter je Woche geben.
- Zunächst nicht zu viel füttern.
Es muss noch genügend Platz für Brut vorhanden sein.
- Ab September werden Jungvölker dann mit 15kg Zucker für den Winter aufgefüttert.

Monatsversammlung Juni 2026

Pflege von Jungvölkern

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



- Bei Jungvölkern kann im Sommer Thymol verdunstet werden.
- Bei Jungvölkern wird Anfang September eine Varroa Kontrolle durchgeführt.
- Wenn der Befall über der Schadschwelle liegt, wird im Volk 150ml AS 60% ad us vet verdunstet.
- Nur mit AS behandeln, wenn es wirklich nötig ist.
Bei der Behandlung geht ein Teil der Brut verloren.
Die wird vor allem bei Jungvölkern dringend benötigt, um vor dem Winter eine ausreichende Volksstärke zu erlangen.

Monatsversammlung Juni 2026

Honig Schleudern

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



In der Regel gibt es für den Hobby Imker mindestens zwei Gelegenheiten, Honig zu schleudern

- Frühjahres- Blütenhonig

Termin für Blütenhonig ist nach Ende der Rapsblüte

- Sommer- Waldhonig

Termin für Sommertracht ist nach Ende der Lindenblüte

Vorsicht: Solange eine Massentracht anhält, wird ständig frischer Nektar eingetragen, der Wassergehalt kann dann zu hoch sein.

Monatsversammlung Juni 2026

Honig Schleudern

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Wassergehalt

- Nach den Regeln des DIB muss der Wassergehalt $<18\%$ sein
- Die Honigverordnung erlaubt bis zu 20%
- Honig, der zu feucht ist, wird früher oder später gären.

Es entwickelt sich Schaum auf der Oberfläche.

Die Masse wird dünnflüssig.

Der Honig wird „sauer“ und ist höchstens noch als Backhonig verwendbar.

Monatsversammlung Juni 2026

Honig Schleudern

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Wassergehalt

- Bienen werden den Honig verdeckeln, wenn sie ihn für haltbar halten.
- Das muss aber nicht immer stimmen.

Wenn in kurzer Zeit sehr viel Tracht eingetragen wird, werden „Dickwaben“ angelegt. Die Honigwaben sind oft verdeckelt, obwohl der Honig noch nicht trocken genug ist.

- Nur ganz oder fast ganz verdeckelte Waben schleudern!

Monatsversammlung Juni 2026

Wassergehalt **Vorsicht:**

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



- Wenn man Honig flüssig in Eimern lagert, wird sich der „schwere Zucker“ nach unten absetzen.
- Die oberen Schichten im Eimer enthalten dann relativ mehr Wasser.
- Wenn der Eimer nicht ganz dicht abschließt, kann der Honig Wasser aus der Luftfeuchtigkeit aufnehmen (Honig ist hygroskopisch).
- Die oberste Schicht im Eimer kann gären.
Das setzt sich dann immer weiter nach unten fort.
- Besser: Honig rühren, wenn er anfängt zu kandieren.
Dabei wird Zucker und Wasser gleichmäßig verteilt.

Monatsversammlung Juni 2026

Honig Schleudern

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Eine voll verdeckelte Zander Wabe wiegt ca 3,5kg

© Uwe Wacker 11. Juni 2026

Monatsversammlung Juni 2026

Honig Schleudern

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Wassergehalt

Am besten ist es, den Wassergehalt mit einem Refraktometer zu bestimmen



Monatsversammlung Juni 2026

Honigbiene
in einer
Mohnblüte



Themen für Juli 2026

- Abschleudern
- Reduktion der Völker auf zwei Magazine
- Varroa Diagnose und Bekämpfung
- Pflege von Jungvölkern